

Farmaci antinfiammatori non steroidici e rischio cardiovascolare

Zoran Olivari

Direttore Dipartimento Cardiovascolare, Cà Foncello, Treviso

Milano, 13 novembre 2014

Effetti **terapeutici** di antinfiammatori non steroidei

- **Antifebbrili**
- **Antiinfiammatori**
- **Analgesici**

Effetti **avversi** di antinfiammatori non steroidei

- **Danni gastrointestinali**
- **Aumento della pressione arteriosa**
- **Aumento della aggregabilità piastrinica (aumento rischio di eventi cardiovascolari)**

Quali possibili complicanze cardiovascolari legate all'uso dei FANS ?

- **Aumentato rischio di infarto miocardico**
 - **Aumentato rischio di ictus**
- **Aumentato rischio di scompenso**

In quali malati l'uso dei FANS aumenta i rischi ?

- **Pazienti che hanno una malattia alle coronarie**
- **Pazienti con scompenso cardiaco**


L'uso dei FANS, di quanto aumenta il rischio in pazienti cardiopatici?

- Infarto miocardico **37%**
- Ictus **21%**
- Scompenso **18%**

L'uso dei FANS, di quanto aumenta il rischio in pazienti cardiopatici?

**Ogni 61 pazienti trattati si avrà
1 caso di
decesso/infarto/ictus**

Associazione malattie cardiovascolari e malattie osteoarticolari





Azienda ULSS N. 9 - TREVISO

Dipartimento Cardiovascolare
Struttura Complessa di **CARDIOLOGIA**
Direttore: Dr. Zoran Olivari

Consigli nella lettera di dimissione

Ripresa graduale dell'attività fisica evitando sforzi intensi e prolungati.

Controllo attento dei fattori di rischio cardiovascolare.

Consumare giornalmente verdure crude o cotte, frutta fresca; pesce e legumi almeno 2 volte alla settimana; preferire le carni bianche, limitare i grassi animali (burro, formaggi, insaccati, carni rosse); usare olio extravergine di oliva; opzionale 1 bicchiere di vino, possibilmente rosso, a pasto.

Smettere di fumare.

Il colesterolo LDL dovrebbe essere inferiore a 100 mg/dl

Secondo la nota AIFA (G.U. n.197 del 24/8/12, aggiornata al 15/7/13) in questo paziente affetto da **scompenso cardiaco moderato** è controindicato l'uso dei Coxib (inibitori selettivi della ciclossigenasi 2)

Secondo la nota AIFA (G.U. n.197 del 24/8/12, aggiornata al 15/7/13) in questo paziente affetto da **patologia cerebrovascolare** è controindicato l'uso dei Coxib (inibitori selettivi della ciclossigenasi 2) e del diclofenac

Secondo la nota AIFA (G.U. n.197 del 24/8/12, aggiornata al 15/7/13) in questo paziente affetto da **arteriopatia periferica** è controindicato l'uso dei Coxib (inibitori selettivi della ciclossigenasi 2) e del diclofenac

Secondo la nota AIFA (G.U. n.197 del 24/8/12, aggiornata al 15/7/13) in questo paziente affetto da **cardiopatía ischemica** è controindicato l'uso dei Coxib (inibitori selettivi della ciclossigenasi 2) e del diclofenac

Secondo la nota AIFA (G.U. n.197 del 24/8/12, aggiornata al 15/7/13) in questo paziente affetto da **scompenso cardiaco grave** è controindicato l'uso dei FANS e dei Coxib (inibitori selettivi della ciclossigenasi 2)

Survey Demoskopea 2012 in Italia

**100 soggetti 60-80
anni**

**75% con dolori
osteoarticolari**

70% fa uso di FANS

Survey Demoskopea 2012 in Italia

**...quindi, 53% di italiani
con l'età fra 60-80 anni
fa uso di FANS, spesso
su "autoprescrizione"**

70 fa uso di FANS