

Se stai per partorire o desideri avere un bambino è il momento di pensare al richiamo contro la pertosse!

- Per gli adulti il vaccino antipertosse è disponibile in combinazione con i vaccini antitetano e antidifterite.
- Con una vaccinazione hai l'opportunità di proteggerti da tre malattie.

Con la vaccinazione di richiamo contro la pertosse proteggi anche il tuo bambino!

D.N.Da

Osservatorio Nazionale
sulla salute della Donna

Via Fatebenefratelli, 17 Milano 20121
Tel: 02.29015286 Fax: 02.29004729
e-mail: info@ondaosservatorio.it
www.ondaosservatorio.it

D.N.Da

Osservatorio Nazionale
sulla salute della Donna

PERTOSSE

**che cos'è
e
come prevenirla**

Che cos'è la pertosse?

- La pertosse (tosse canina o tosse convulsa) è una malattia infettiva e molto contagiosa delle vie respiratorie.
- E' causata da un batterio.
- Si trasmette attraverso microscopiche goccioline di saliva emesse quando si tossisce o si starnutisce.

Quali sono i sintomi della pertosse?

- La pertosse si manifesta con febbre attacchi di tosse intensa, spesso molto ravvicinati, che causano inspirazioni forzate (il caratteristico urlo della pertosse), e sono spesso seguiti dal vomito.
- I sintomi possono durare fino a 6-10 settimane.

Chi può essere a rischio?

- I neonati non vaccinati o che non hanno completato il ciclo di vaccinazione.
- Adulti e adolescenti che hanno perso la protezione conferita dalla vaccinazione dell'infanzia o dalla malattia naturale.

Quali sono le possibili complicanze?

- I neonati e i bambini molto piccoli (sotto 1 anno) hanno il maggiore rischio di essere ricoverati in ospedale a causa di complicanze gravi.
- Il 20% dei casi di pertosse del neonato richiede il ricovero in ospedale.
- Le complicanze più frequenti sono:
 - polmonite
 - difficoltà respiratorie e crisi di soffocamento
 - disturbi neurologici

Come si cura la pertosse?

- La pertosse si può curare con gli antibiotici, cortisone e sedativi della tosse, che tuttavia riducono solo di poco il rischio di complicanze gravi.

E' possibile prevenirla?

- La pertosse si previene con la vaccinazione.
- Il vaccino anti-pertosse è efficace e sicuro.
- Il vaccino è offerto gratuitamente a tutti i nuovi nati e agli adolescenti.

Chi si dovrebbe vaccinare?

- Tutti i nuovi nati secondo il calendario delle vaccinazioni in vigore in Italia che prevede:
 - 3 dosi nel 1° anno di vita (3, 5 e 11 mesi)
 - Un richiamo a 4-6 anni
 - Un richiamo nell'adolescenza
- Gli adulti a contatto con i neonati: genitori, nonni, zii, fratelli e cugini che non hanno ancora fatto i richiami previsti dal calendario delle vaccinazioni.

Perché vaccinare gli adulti a contatto con i neonati?

- Perché in oltre la metà dei casi di pertosse osservati nei bambini troppo piccoli per poter essere vaccinati o che non avevano finito il ciclo di vaccinazione, la fonte di contagio è stata un genitore o un familiare.
- Perché con il tempo gli adulti perdono la protezione conferita dalla vaccinazione dell'infanzia o dalla malattia.